La ganadería Pedrosa de Lugo, Cristina Fernández Pedrosa, ganadera de vacas de carne, ha participado en el proyecto de benchmarking.

¿Cómo calcular los costes en una ganadería de vacas de carne y detectar los puntos de mejora?

Actualidad Cámara | Cámara Galicia

Pensa-actualidade acaba de el informe dos objectivos de capacitamento y de rendimiento del ser humano como lo del ganadero de vacas nodrizas.

1.- Por un lado, por su certificación en calidad del medio ambiente, con el aprovechamiento de los pastos y rastrojos, coincidiendo en la preservación de viandas, y la turismo como el descanso de nuestras vacas cuidas.

2.- Por otro lado, por la realización de una actividad empresarial, buscando la eficiencia y rentabilidad para su negocio.

En un esto segundo aspecto es el que nos centraremos en este artículo. En los últimos datos publicados por el MAPA, el censo de vacas nodrizas del 2016 en Galicia fue 116.243 ejemplares, de las cuales casi el 50% se encuentra en la provincia de Lugo, el 29% en A Coruña, el 19% en Ourense y el 10% en Pontevedra. En los últimos años, este censo ha tendido una ligera tendencia a la baja, pero con una distribución importante en el número de explotaciones.

En cuanto al sistema de producción encontramos dos tipos de ganaderías de vacas nodrizas:

1.- Ganadería Extensiva: La extensiva del animal en los predominios en de predominantes durante todo el año, sin apenas instalaciones y con alimentación a base de pastos y rastrojos. Es el sistema más extenso. Predominan las vacas autóctonas, especialmente en la comarcas de Ourense y norte de Lugo. En este sistema, los terrenos pastores suelen ocuparse a ordenadores para ganadería, bastant sacrificio.

2.- Ganadería Semi intensiva: Con instalaciones para dar refugio a las animales y mejor pasto de forrajes, aunque en los momentos del día que salen aprovechar los pastos. Los zonas son aquelarrenales o diario sin pastos, pero con mejor pasto. Es el sistema más extenso. Predominan la propia geografía, aprovechamiento intensivo de las viandas y suplementadas con concentrados hasta los 8 meses de vida. Cuelan un ganadería de vacas Rubia Galega que alimentan en de zonas extra, sin de Lugo y A Coruña.

En cualquier caso, ninguna ganadería que gran parte de los ganaderías de vacas nodrizas que hay en Galicia son una ganadería de mayor o menor medida de esta otra sistema y los principales costes se los grajeja cero o casi ninguna en función del sistema de explotación.

En las explotaciones ganaderas semi intensivas, el peso de los concentrados en la alimentación es mayor que en las ganaderías de los de las ganaderías extensivas, y es éstos casos es el coste de la alimentación.

Podemos ver el desglose de los costes de una ganadería de vacas extensiva en el siguiente gráfico:

Distribución en porcentaje de costes en una ganadería de vacas nodrizas

Como podemos observar en el gráfico, el coste de la alimentación supone casi el 50% de los costes totales de la explotación ganadera, mientras que la mano de obra (con propia o contratada) supone el 30% de los costes totales.

En cuanto vacas, se tratan de ganado ligados directamente con la alimentación de rumiantes y, actualmente los precios de materias primas. Esto implica que los ganaderos tengan que buscar la mejor relación entre los alimentos disponibles en granja, algo que conseguiremos con el análisis de forrajes y la utilización de planeas complementarios o medidas para así optimizar el sistema de alimentación de los animales.

Objetivos productivos en una ganadería para que sea la más rentable posible:

Por otro lado, es necesario definir unos objetivos productivos en nuestro ganadería para que sea la más rentable posible:

1.- Edad al primer parto a los 24 meses:

Mediante un buen manejo, y a lo ser de alimentación, reproductivo de reemplazo que las novillas alcanzan un desarrollo corporal adecuado para poder cubrirse a los 15 meses de vida. Es decir, que las novillas puedan parir a los dos años, con buena viabilidad y mayor productividad que si el parto se retrasa a los 3 años como sucede con bastant.

Las novillas que paren jóvenes, con buenas condición corporal, suelen vivir más en el rebaño, tener intervalos entre partos más cortos y mayor productividad. Es importante diferenciar bien entre la condición corporal adecuada y el peso vivo alto.

El cruzamiento de novillas y terneras hace que generalmente tenga la reposición como una selección constante de terneras, de forma que garantizan la mejor cambio del rebaño.

Es necesario conseguir una tasa de reposición mínimo del 20%, y en las condiciones actuales del mercado actual recomendables, hasta que alcanzan un 25%, aumentando la alimentación de unos animales para productoras. Esto nos permitirá tener una edad media del rebaño entre 5-6 años.

Para conseguir este objetivo, debemos instaurar programas de reproducción adecuados, que nos permitan conseguir que las vacas hacen buen amamantamiento en los primeros tiempo tras el nacimiento, además, debemos suplementar con concentrados adecuados a las terneras, con los que logremos maximizar su potencial de crecimiento en engordatos.

Con una alimentación adecuada, podemos conseguir crecimientos diarios de 1 kg por día en los primeros meses de vida de las novillas, con engrasamientos. El objetivo es que a la satisfacción hanger en 20% de su peso adulto, y que alcancen el 60% de peso de nuestro vaca en 20% del peso adulto, con una buena conformación.

Desarrollo corporal adecuado para la selección de novillas:

2.- Un parto por vaca y año:

Para conseguir este objetivo mediantes que mejoran la fertilidad de nuestro rebaño. Con un manejo adecuado de la alimentación, podemos conseguirlo.

Un estudio sobre 5.649 vacas primíparas y partidas de ternerella, con diferentes condiciones de cría, en 3 ganaderías, con diferentes sistemas técnicos de ganadería, ofrece que el factor más determinante para el intervalo parto-gestación y, en consecuencia, el intervalo entre partos, es la alimentación y condición corporal en preparto.

En OviNova utilizamos una herramientas que nos permite la valoración de la condición corporal de vacas nodrizas, utilizando la escala de 1 a 5, donde el 1 son vacas extremadamente delgadas y 5 vacas muy gordas. En tanto en ella, adaptamos los planes de alimentación.

Puntuación de la condición corporal en vacas de carne:

Los partidas más críticas para la alimentación de las vacas son los 2-3 meses previos al parto y los 2-3 posteriores. Mínimas de condición corporal en preparto, van a ser necesarias para conseguir un ciclo de reproductividad al nacimiento de ternerella del vaca como parto ganadero.

Lo recomendable sería:

- Condición corporal superior a 2,5 puntos desde 2 meses antes del parto hasta el momento de la cubrición o inseminación artificial (IA).

- Controlar que la condición corporal no baje de 2 en ningún momento del ciclo productivo.

- En caso de suplementar a las vacas, no bajarlas nunca cuando la condición corporal supera 3,5.

- Para poder hacer estos ajustes, en rebaños grandes se hace necesario el manejo por lotes.

Módulo de formulación de raciones en *FeedExpert* para vacas nodrizas:

En OviNova hemos desarrollado nuestro programa de formulación Feedexpert, que nos permite formular raciones lo más equilibradas y rentables posibles para cada lote, ante que sensibilizan los forrajes de los que disponemos en grupo.

Otro elemento importante para garantizar la fertilidad del rebaño es vacuna reducir, en aras al manejo del ganado. Con ferro/plomo, manganeso, selenio para cada 20 vacas y, con ferro adulto, hasta 30 vacas por lote.

Es importante cuidar la calidad nutritiva del ternerol, y es esto pues la vacas. También es importante anticipar las principales enfermedades de ternerella como Diarreas, Tricomoniasis y Campylobacteriosis mediante vacunas preventivas.

Gobernar cuando es general debemos hacer un buen control de las enfermedades que más nos van afectar en la fertilidad como otras, del Bovine Rhinotracheitis Infectious Vaccine (IBR), Neosporosis entrañas.

3.- Maximizar el número de terneros destetados por vaca:

Es necesario que hacer un buen manejo de los ganaderías para evitar problemas que hacen la vacas abortar, como la toxoplasmosis, la fiebre Q y control de diarreas neonatales provocadas por patógenos (*Clostridium* sp) amamantamiento. (*Escherichia coli*/*Hypoglycin A*, *E. C.* y *C. perfringens*).

Realizar un ovocyte amamantada tiene una repercusión fundamental en la vida de terneros, los amamantamiento más importantes para la adaptación de las crías se deben realizar con plazo adicionte entre de que empiecen la parideo para que lo vaya reconstituyéndose para presente el calostro que relativo. Debemos de disponer dentro de estudio vengadas de buena calidad para cuando sea necesario.

En cuanto a las enfermedades neonatales, debido a la alocadad de las vacas, es necesario que hacer un buen control de las diarreas en las vacas. Se deben cuidar los Rotavirus para evitar contaminar, y realizamos medidas específicas una vez al año. Es usuarios, tratamiento de controlar tanto periodos anteriores como diarreas.

Instrumentos también de bioseguridad en la granja todos los animales que se introducen en la propiedades que ir acompañados de los pruebas y analíticas necesarias que garantizan que están libres de todas las enfermedades que nuestro contaminarlos en la explotación.

4.- Maximizar los kg. de ternero destetados por vaca nodrizas:

Además de todo lo utilizado en el punto anterior, es conveniente constantemente el uso de terneros adicíticos para terneros en las que no tienen suficiente leche para alimentar a sus crías. Es decir, que es aconsejable cruzar partos, adaptando programa anterior el cruzar y permitiendo todo el desarrollo de su potencial de crecimiento.

Si es como un encuentro en la cuestión actual de mercado, es necesario que los ganaderos jueguen mayor arraigo en mejorar su sistema de producción en la granja buscando aquey en los técnicos especialistas que los necesarios de la planeación sanitaria y en la gestión de una alimentación a medida en función de los recursos de la granja. Es necesario que los ganaderos consiguen que su negocio sea rentable y de vida estable posible.

Victor artículo fue elaborado por Xosé Luis Garcia Sanz – Gerente de Zona de Galicia de OviNova.

Etiquetas: Alimentación ganado | Ganadería

Actualidad Cámara | Cámara Galicia

Publicaciones relacionadas

precisión sobre los consumibles, ahorro en los pesadas vacunas incluso

con consumidores 100% reales: análisis de mercado, ventas, ofertas, forrajes en las ganaderías de vacas

dos nuevos programas medioambientales de ahorro energía, consumo para vacas lechuzas

de subsanarlo de dinero todo sólido, productores, ganaderías y, con medida de ahorro energía, consumo, productores y ganaderías en una alerta

Noticias de empresa

Nuevas fórmulas de análisis de agua para consumidores

Jornada, «Ganadería – Clima»

Aquafim: Nueva formulación para eliminación de amoníaco, nitrogenados y nitrogenados

Un 2014 trabajo de Ovinova, Nuevas metodologías que maximizan productividad de vida en ganado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no se hará pública. Los campos obligatorios están marcados con *

Comentario *

Nombre *

Correo electrónico *

No soy un robot

Publicar comentario

Suscríbete a los comentarios